

Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante  
- EPAC -  
1999-2003  
**Morsures**

## MÉTHODE

Les résultats sur les accidents de la vie courante présentés dans ce document ont été établis à partir des données transmises par les centres hospitaliers participant ou ayant participé entre 2002 et 2003 au réseau de l'Enquête Permanente sur les Accidents de la Vie Courante (EPAC) : CHG d'Annecy, CHU de Besançon, CH de Béthune, CHU de Bordeaux, CHU de Reims, CH Bretagne-Atlantique de Vannes-Auray. Le Centre hospitalier universitaire de Reims n'a collecté des données qu'en 2002 et le centre hospitalier de Vannes-Auray qu'en 2003. Le CHU de Besançon ne collecte des données qu'aux urgences de pédiatrie.

Le principe de ce recueil repose sur l'enregistrement, aux urgences de quelques hôpitaux volontaires, des venues de patients pour accident de la vie courante, avec des données concernant la personne accidentée (âge, sexe, résidence), sa prise en charge (date et heure d'arrivée aux urgences, traitement, hospitalisation éventuelle), les caractéristiques de l'accident (mécanisme, lieu, activité, type de lésion, partie du corps lésée), les produits (agents, éléments) ayant causé ou étant impliqués dans l'accident.

**Les résultats de cette enquête ne sont représentatifs que des accidents de la vie courante pris en charge aux urgences de ces hôpitaux.**

## RÉSULTATS

La base EPAC 1999-2003 contient 3 970 enregistrements concernant des morsures, ce qui représente 1,6 % des 247 221 accidents collectés.

Répartition des morsures selon l'âge :

Âge	Effectifs	%
0-4 ans	788	20
5-9 ans	646	16
10-14 ans	437	11
15-19 ans	224	5,6
20-25 ans	271	6,8
25-29 ans	260	6,5
30-34 ans	201	5,1
35-39 ans	195	4,9
40-44 ans	179	4,5
45-49 ans	185	4,7
50-54 ans	185	4,7
55-59 ans	104	2,6
60-64 ans	81	2,0
65-69 ans	58	1,5
70-74 ans	55	1,4
≥ 75 ans	101	2,5
Total	3 970	100

La fréquence des recours aux urgences suite à une morsure diminue quand l'âge augmente, passant de 20 % pour les 0-4 ans à 2,5 % pour les plus de 75 ans. Les hommes sont plus nombreux à être victime de ces accidents que les femmes (Sex ratio homme/femme = 1,3)

Répartition des morsures selon la partie lésée :

Partie lésée	Effectifs	%
tête	1 307	33
tronc	113	2,8
membres supérieurs	1 843	46
membres inférieurs	638	16
Autre	13	0,3
Inconnu	56	1,4
Total	3 970	100

La majorité des morsures concerne les membres supérieurs (46 %) suivi de la tête (33 %). Viennent ensuite les atteintes des membres inférieurs (16 %) et du tronc (2,8 %).

Répartition des morsures selon la modalité de prise en charge :

Prise en charge	Effectifs	%
examiné, traité	1 298	33
suivi ultérieur	2 102	53
hospitalisé	561	14
Décédé	1	0,0
inconnu ou transfert	8	0,2
Total	3 970	100,0

Plus de la moitié (53 %) des morsures nécessite un suivi ultérieur et 33 % sont traitées aux urgences sans suivi. Les patients sont hospitalisés dans 14 % des cas (la proportion d'hospitalisation est de 11 % pour l'ensemble des accidents de la vie courante dans EPAC). Parmi les 3970 patients venus aux urgences à la suite d'une morsure, un décès est survenu après une hospitalisation de 5 jours.

-----